

# BETEGTÁJÉKOZTATÓ

## A PRONTODERM® TERMÉKCSALÁD MŰTÉT ELŐTTI PREVENCIÓS HASZNÁLATÁHOZ

### TISZTELT PÁCIENS!

A multirezisztens kórokozók (MRK), mint például az MRSA (methicillin rezisztens staphylococcus aureus) egyre nagyobb problémát okoznak az egészségügyben, és komoly hatással vannak a társadalomra. A multirezisztens kórokozók kolonizálhatják a bőrt (a kórokozók megtelepedhetnek a bőrön, amit kolonizációnak nevezünk). A kolonizációt mindenáron kerülni kell, hogy a komolyabb problémákat, például a fertőzéseket megelőzzük, különösen a sebészi beavatkozások előtt, katéteres vagy immunszupprimált betegek esetén. Ez a tájékoztató megmutatja, hogy a Prontoderm® termékcsaláddal hogyan lehet a dekolonizációt végrehajtani.

### AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKKAL SZERETNÉNK SEGÍTENI ÖNT A SEBÉSZETI MŰTÉTRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A beteg, legyengült, műtéten átesett szervezet sok veszélynek van kitéve. Egyre többet hallani műtéti sebek elfertőződéséről, műtétek kapcsán kialakuló, különböző kórokozók által okozott fertőzésekről.

### Ennek megelőzésében Ön is aktívan részt vehet!

- Figyelmébe ajánljuk a Prontoderm® termékcsaládot. Egy nagyszámú csoporton végzett németországi tanulmány szerint (2020 Berlin, 6 ortopéd klinika részvételével) a termékcsalád használatával jelentősen csökken a műtéti sebfertőzés kialakulásának veszélye.
- Amennyiben saját biztonsága érdekében vállalja a Prontoderm® termékcsaláddal történő mosakodást, mindenképpen közölje orvosával, vagy az Önt felkészítő egészségügyi dolgozóval.
- A megfelelő eredmény elérése érdekében még otthonában, 4 nappal a műtét előtt meg kell kezdenie a testtisztítással történő felkészülést, majd a műtét napján a kórházban kell befejezni (5. nap).
- A termékek beszerezhetőek a B. Braun Trading Kft. internetes áruházában, a [www.bbraunshop.hu](http://www.bbraunshop.hu) címen.
- További kérdés esetén várjuk jelentkezését a következő elérhetőségen: [infohu@bbraun.com](mailto:infohu@bbraun.com).



# HASZNÁLATI UTASÍTÁS MŰTÉTEK ELŐTTI FÜRDÉSHEZ\* JÁRÓBETEGEK RÉSZÉRE

## A MŰTÉT ELŐTTI BETEGFÜRDETŐ CSOMAG TARTALMA:

### Termékek

- Prontoderm® kendő
- Prontoderm® orrgél
- ProntOral® garatöblítő

### Kiegészítő termékjavaslatok

- Prontoderm® hab
- Prontoderm® oldat

## HASZNÁLAT: MŰTÉTET MEGELŐZŐ 5 NAPON KERESZTÜL



### Szájüreg tisztítása

Fogmosást követően öblögesse szájüregét naponta háromszor 10 ml ProntOral® garatöblítővel és gargalizáljon minimum 30-60 másodpercig.



### Orrüreg tisztítása

Naponta háromszor tisztítsa meg az orrüregeket pamut fültisztító pálcával (eltávolítva ezzel minden makacs orrvadadékot), majd mindkét ornyílásba juttasson Prontoderm® orrgélt egy új pamut fültisztító pálcá segítségével.



### Test lemosása

Alkalmazza a megszokott tisztálkodó szert zuhanyzáshoz vagy fürdéshez, majd törölközővel törölje szárazra bőrét. Ezt követően naponta egyszer használja a Prontoderm® kendőket a teljes testfelület áttörlesztéséhez, testtájékonként 1-1 külön kendő segítségével. Alternatív megoldásként használhat Prontoderm® habot, Prontoderm® oldatot is a kezeléshez, egyenletesen elosztatva a teljes testfelületen. A termék antimikrobiális barrier hatása 24 órán át tart. A szert ne mossa le a testről alkalmazás után!

A kezelés után ne használjon testápoló készítményeket, mivel a Prontoderm® termékek tartalmaznak bőrápoló összetevőket!

### Ajánlott kiegészítő kezelés: hajmosás

Hosszabb haj esetén a Prontoderm® hab használatát javasoljuk. Naponta egy alkalommal dörzsölje be a hajas fejbőrt Prontoderm® hab segítségével (a hagyományos samponnal történő tisztítást követően), a haj hosszának megfelelő mértékben. Hagyja a fejbőrön megszáradni a habot, alkalmazás után ne mossa le!

Behatási idő: 3 -5 perc

### Általános javaslatok

- Ha fogprotézissel rendelkezik, tisztítás után áztassa a fogprotézist ProntOral® garatöblítőbe!
- Használjon eldobható fogkefét fogmosáshoz!
- Fertőtlenítse kezeit Softa-Man ViscoRub® termékkel.\*\*
- Ha hallókészüléket vagy szemüveget visel, a hallókészüléket és szemüveget törölje át Prontoderm® kendővel vagy Prontoderm® oldattal\*\* átítatott kendővel.
- A bőrrel érintkezésbe kerülő textíliákat (pl. lepedő, alsó ruházat, törölközők) lehetőség szerint naponta cserélje és mossa legalább 60 °C-on.
- A kezelést követően ne alkalmazza újra a tisztálkodáshoz használt személyi higiénés termékeket (pl. fogkrém, golyós dezodor, bőrápoló), dobja ki azokat.

### Felületfertőtlenítés Meliseptol Wipes® sensitive kendőkkel

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) szerint a felületfertőtlenítés hatékony kiegészítő kezelés lehet az MRK (multi-rezisztens kórokozó) dekolonizáció szempontjából<sup>1</sup>. Fertőtlenítse a fürdőszobát, a villanykapcsolókat, az ajtókilincseket, az éjjeli szekrényt Meliseptol Wipes Sensitive® törlőkendő\*\* segítségével!

### Sebkezelés

Sebkezeléshez szintén dekolonizáló hatású seböblítő oldatot (pl. Prontosan®\*\*) használjon.

<sup>1</sup> <https://www.cdc.gov/> (2016. október 25-én hozzáférhető tartalom alapján)

\*Bővebb információért lásd a termékekhez mellékelt betegtájékoztatókat!

\*\*Szintén megrendelhető a [www.bbraunshop.hu](http://www.bbraunshop.hu) címen

