



Teljes test dekolonizációja

Hogyan járulhat hozzá
saját biztonságához
a kórházi felvétel előtt

Felkészülés a kórházi felvételre


Az egészséges emberek testén előforduló baktériumok általában szokványosak és ártalmatlanok, azonban ezek a mikroorganizmusok bizonyos körülmények között – különösen kórházi kezelés során – súlyos fertőzéseket okozhatnak. Megelőző lépésekkel Ön is hozzájárulhat saját biztonságához.

Javasoljuk a Prontoderm® készítménnyel végzett teljes testre kiterjedő dekolonizálást, amelynek célja

- a kórházi felvételre vagy a műtéti beavatkozásra való felkészülés;
- a bőrön, illetve hajban, szájban és orrban található kórokozók mennyiségének a csökkentése (dekolonizáció);
- a rekolonizáció megakadályozása hosszan tartó antimikrobiális védőhatás révén;
- csökkenteni annak kockázatát, hogy a kórházi kezelését elhalasztják a bőrén lévő mikrobák miatt.

Alkalmazás

Az alkalmazást 4 nappal a kórházi felvétel vagy műtét előtt javasoljuk elkezdni úgy, hogy a dekolonizációs ciklus keretében történő utolsó lemosás a műtét napjára essen. Kérjük, egyeztesse kezelőorvosával a dekolonizáció lépéseit. A termékeket a csomagolásukon található használati utasításnak megfelelően kell használni.



A test és a haj dekolonizációja

A Prontoderm® habot naponta egyszer alkalmazza, miután a szokásos tusfürdőjével vagy samponjával megmosta a testét és a haját.

Mivel leöblítést nem igénylő termék, zuhanyzást követően ajánlott használni



Az orr dekolonizációja

A Prontoderm® orrgél alkalmazása naponta 3-szor.



A száj és a torok dekolonizációja

A ProntOral® alkalmazása naponta 3-szor a szokásos fogmosás után.

Javasoljuk, hogy a műtét után 1 héttel is folytassa a teljes testre kiterjedő dekolonizáló lemosást.

Hol lehet megvásárolni a Prontoderm®-et?



Elérhető a gyógyszertárakban és a www.bbraunshop.hu oldalon.

Videó: Hogyan kell elvégezni a teljes testfelület lemosását



<https://bbraun.info/prontodermvideo>